

Coxistac 12% Granular

NOMBRE COMERCIAL:

Coxistac 12% Granular

DESCRIPCIÓN:

Coxistac 12% Granular es una premezcla anticoccidial de amplio espectro.

COMPOSICIÓN:

12 gramos de Salinomocina por 100g de producto.

INDICACIONES:

Para la prevención de coccidiosis causada por cepas causada por *Eimeria tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. mivati* sensibles a la salinomocina.

MODO DE USO:

Mezclar 500g (0,5 kg) de Coxistac 12% por tonelada métrica (1000 kg) de alimento para proveer 60ppm de salinomocina en alimento terminado. Usar continuamente en la ración de pollos de engorde.

El producto debe mezclarse con la ración y ésta utilizarse inmediatamente.

MODO DE CONSERVACIÓN:

Mantener y conservar el producto en un local fresco y seco a una temperatura entre 15° y 30° C

Los envases utilizados deberán descartarse de acuerdo con la legislación local vigente.'

ADVERTENCIAS:

Manéjese con cuidado. Lávese las manos completamente después de la preparación.

Durante el mezclado de alimentos los operarios deben usar ropas y máscaras protectoras.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

RESTRICCIONES DE USO:

No administrar gallina ponederas

PRECAUCIONES:

- Para usar en pollo de engorde (Parrilleros)
- No exceder la dosis recomendada

- No administrar Tiamulina a las aves que reciban Coxistac.
- Asegurarse que las premezclas de Coxistac no sean accidentalmente administradas a otras especies de aves u otros animales

PERIODO DE RETIRO:

El periodo de retiro en pollos de engorde es de cero días.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 25 kg.

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION™

PhibroAnimalHealthdeArgentinaS.R.L.
Rutherford4503-GrandBourg(B1615GYC)-Pcia.Bs.As.
Tel./Fax:(03327)44-4567
info.phibroarg@pahc.com
www.phibrosaludanimal.com
ARG- ABR 2022

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®